

Ordination av vaccin för skolläkare

1. Skolläkarordination ska göras under "Skolläkaranteckning" i Prorenata. Välj kontakttyp "vaccinationsbedömning"

Kontakttyp

Vaccinationsbedömning ▼

2. Under "Bedömning" dokumenteras elevens bakgrund relaterat till vaccinationsstatus och i "Åtgärd" ska ordinationen dokumenteras.

Det ska tydligt framgå att det är en ordination, vaccinet innehåll, vaccinets namn, mängd, lokalisering samt tidsintervall mellan vaccinationerna om det är aktuellt. Se nedanstående exempel.

Ordination grundvaccination

Dos 1: DTP+IPV samt MPR, Tetravac 0,5 ml im, samt Priorix 0,5 ml im

Dos 2: 1,5-6 mån efter dos 1, DTP+IPV, Tetravac 0,5 ml im

Dos 3: 6-11 mån efter dos 2, DTP+IPV samt MPR, Tetravac 0,5 ml im samt Priorix 0,5 ml im

dT_pP IV ska sedan erbjudas 3-5 år efter dos 3 men behöver då ordineras.

I Prorenata finns möjligheten att lägga in dessa ordinationer som ett frasminne, kontakta systemadministratörer om du önskar support runt detta.

3. I Prorenata finns ingen ordinationsmodul för skolläkare. Skolsköterskan ger de av skolläkaren ordinerade vaccinen efter inkomna vaccinationssamtycken. Viktigt att skolläkarens ordinationer är utformade på samma sätt då eleven kan hinna byta skola under en eventuell uppvaccinering.